

XIX Congreso Mexicano de Psicología

Presente y futuro de la Psicología;
práctica basada en evidencia



De la Salle  Universidad
La Salle Cancún




Programa Científico

Cancún, Quintana Roo



Control parental, Sintomatología depresiva y Consumo de alcohol en adolescentes



CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES



Fuente: Villatoro, Gaytán, Moreno et al. 2009

(Villatoro, Gaytán, Moreno, Gutiérrez, Oliva, et al., 2011)

CONSUMO DE ALCOHOL EN ESTUDIANTES



Fuente: Villatoro et al. 1997, 2000, 2003, 2006 y 2009.

(Villatoro, Gaytán, Moreno, Gutiérrez, Oliva, et al., 2011)

Consumo de Alcohol


```
graph LR; A[Consumo de Alcohol] --- B[Factores Psicológicos y psiquiátricos]; A --- C[Factores Familiares]; A --- D[Factores Contextuales];
```


Factores Psicológicos
y psiquiátricos

Factores Familiares


Factores
Contextuales

FACTORES FAMILIARES







**Control
Psicológico**



**Control
Conductual**



**Consumo
de alcohol**

(Abar & Turrisi, 2008; Bahr, Hoffman & Yang, 2005; Ham & Hope, 2003)

FACTORES PSIQUIÁTRICOS

Depresión

- **En población adulta con problemas de dependencia severa** (Glide & Pine, 2002; Kelder, Murria, Orpinas, Prokhorov, Mc Reynolds, Zhang, et al., 2001).
- **En adolescentes hay resultados contradictorios, algunos reportan una asociación positiva entre sintomatología depresiva y consumo de alcohol** (Rodríguez, Dallos, González, Sánchez, Díaz, Rueda, et al., 2005; Patock-Peckham & Morgan-López, 2009) **y otros no** (Lindsey, Fabiano & Stark, 2009).

Determinar la asociación del control parental (conductual y psicológico) con el consumo de alcohol y la sintomatología depresiva en adolescentes de tres ciudades.

**O
b
j
e
t
i
v
o**

PARTICIPANTES

1914 estudiantes


Secundarias públicas

$M = 13.3$
años

983 Mujeres

931 Hombres

PARTICIPANTES



Escala de Prácticas parentales

(Andrade & Betancourt, 2008)

Mamá

Comunicación

(10 reactivos, alfa=.92)

Autonomía

(7 reactivos, alfa=.86)

Imposición

(8 reactivos, alfa=.81)

Control psicológico

(8 reactivos, alfa=.80)

Control conductual

(7 reactivos, alfa=.84)

I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
o
s

Escala de Prácticas parentales

(Andrade & Betancourt, 2008)

Papá

Comunicación/CC
(16 reactivos, alfa=.97)

Autonomía
(8 reactivos, alfa=.94)

Imposición
(8 reactivos, alfa=.90)

Control psicológico
(8 reactivos, alfa=.90)

I
n
s
t
r
u
m
e
n
t
o
s

INSTRUMENTOS

Depresión

✓ CESD-R

- ✓ Consta de 35 reactivos que miden la presencia y duración de los síntomas en las dos últimas semanas.
- ✓ La confiabilidad de la escala en estudiantes mexicanos fue de 0.93.

(González-Forteza, Jiménez-Tapia, Ramos-Lira & Wagner, 2008, 2010)

INSTRUMENTOS

Consumo de alcohol

Se consideró un indicador de frecuencia y cantidad:

1= no ha consumido,

2= ha consumido pero no más de cinco copas en el último año,

3= ha consumido pero sólo una vez cinco copas en el último año,

4= ha consumido dos o más veces cinco copas en el último año.

Resultados

MUESTRA TOTAL

		Consumo de alcohol	Sintomatología depresiva
Mamá	Control Psicológico	0.212**	0.407**
	Control Conductual	-0.246**	-0.218**
Papá	Comunicación/CC	-0.193**	-0.268**
	Control Psicológico	0.148**	0.303**
Sintomatología depresiva		-0.218**	---

** $p < .001$

Distrito Federal

Mujeres		Consumo de alcohol	Sintomatología depresiva
Mamá	Control Psicológico	0.184**	0.445**
	Control Conductual	-0.316**	-0.320**
Papá	Comunicación/CC	-0.160*	0.336**
	Control Psicológico	0.175**	0.306**
Sintomatología depresiva		0.113	---

Hombres		Consumo de alcohol	Sintomatología depresiva
Mamá	Control Psicológico	0.157*	0.344**
	Control Conductual	-0.230**	-0.106
Papá	Comunicación/CC	-0.242**	0.216**
	Control Psicológico	0.064	0.349**
Sintomatología depresiva		0.090	---

** $p < .001$ * $p < .05$

Veracruz

Mujeres		Consumo de alcohol	Sintomatología depresiva
Mamá	Control Psicológico	0.292**	0.445**
	Control Conductual	-0.357**	-0.320**
Papá	Comunicación/CC	-0.297*	0.336**
	Control Psicológico	0.223**	0.306**
Sintomatología depresiva		0.365**	---

Hombres		Consumo de alcohol	Sintomatología depresiva
Mamá	Control Psicológico	0.145*	0.443**
	Control Conductual	-0.167*	-0.353**
Papá	Comunicación/CC	-0.002	0.059
	Control Psicológico	0.117	0.194**
Sintomatología depresiva		0.149*	---

** $p < .001$ * $p < .05$

Sinaloa

Mujeres		Consumo de alcohol	Sintomatología depresiva
Mamá	Control Psicológico	0.280**	0.448**
	Control Conductual	-0.201**	-0.358**
Papá	Comunicación/CC	-0.244*	0.275**
	Control Psicológico	0.252**	0.348**
Sintomatología depresiva		0.281**	---

Hombres		Consumo de alcohol	Sintomatología depresiva
Mamá	Control Psicológico	0.137**	0.231**
	Control Conductual	-0.241**	-0.174**
Papá	Comunicación/CC	-0.114*	0.139*
	Control Psicológico	0.037	0.216**
Sintomatología depresiva		0.221**	---

** $p < .001$ * $p < .05$

CONCLUSIONES

- Los resultados de este estudio mostraron que el **control psicológico** de los padres influye más en la **depresión** que en el consumo de alcohol de los jóvenes.
- El control conductual afecta tanto a la depresión como al consumo de alcohol.
- Es importante hacer análisis por **sexo** y por **ciudad**, ya que los patrones de relación son diferentes.

CONCLUSIONES

- Tanto la depresión como el consumo de alcohol son fenómenos complejos en los que interactúan diversos factores y aquí sólo se analizaron dos aspectos, por lo cual es necesario incluir otros aspectos individuales, familiares y sociales que permitan una explicación más amplia.

palos@unam.mx